

# UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
PROCESSO SELETIVO  
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS E  
RECURSOS PRÓPRIOS – 16-10-2010

## **Dermatologia**

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

### **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

**DERMATOLOGIA****— QUESTÃO 01 —**

Dentre os medicamentos que com frequência provocam manifestações psicóticas estão:

- (A) Aciclovir – Tetraciclina – Cortisona.
- (B) Hidantoína – Dapsona – Cortisona.
- (C) Cortisona – Antimalárico – Dapsona.
- (D) Dapsona – Antimalárico – Hidantoína.
- (E) Hidantoína – Cortisona – Aciclovir.

**— QUESTÃO 02 —**

Dentre as dermatoses a seguir, assinale a que pode ocasionar alopecia cicatricial:

- (A) Líquen Plano.
- (B) Psoríase.
- (C) Pitiríase Rubra Pilar.
- (D) Dermatômiosite.
- (E) Sífilis Secundária.

**— QUESTÃO 03 —**

Nas dermatoses relacionadas a seguir, qual delas não apresenta o fenômeno de Köebner:

- (A) Líquen Plano.
- (B) Doença de Darier.
- (C) Parapsoríase.
- (D) Eczema Numular.
- (E) Vitiligo.

**— QUESTÃO 04 —**

O ciclo biológico do *Sarcoptes scabiei* variedade *hominis*, dura e torno de:

- (A) 1 a 3 dias.
- (B) 14 a 28 horas.
- (C) 14 a 28 dias.
- (D) 3 a 9 dias.
- (E) 3 a 9 horas.

**— QUESTÃO 05 —**

Na síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS), a clivagem da bolha ocorre na:

- (A) Camada Córnea.
- (B) Camada Espinhosa.
- (C) Camada Basal.
- (D) Camada Granulosa.
- (E) Derme Papilar.

**— QUESTÃO 06 —**

Assinale o efeito colateral duradouro da minociclina utilizada na acne juvenil:

- (A) Alteração Dentária.
- (B) Síndrome Pelagróide.
- (C) Hipocromia.
- (D) Hiperpigmentação.
- (E) Queilite.

**— QUESTÃO 07 —**

Em pacientes com furunculose de repetição, podemos ter como causas prováveis:

- (A) Imunodepressão e dificuldade na absorção dos antibióticos.
- (B) Diabetes, uso inadequado de antibiótico, e muitas vezes, resistência do estreptococo à maioria dos antibióticos.
- (C) Imunodepressão, diabetes e uso inadequado de antibióticos.
- (D) Imunodepressão e, em mais de 80% dos casos, resistência bacteriana à cefalexina.
- (E) Problemas relacionados à absorção dos antibióticos e resistência à vancomicina.

**— QUESTÃO 08 —**

Celulite é um sinal específico de:

- (A) Distribuição irregular de gordura nas coxas, nádegas ou abdômen.
- (B) Doença com padrão autossômico dominante.
- (C) Inflamação da derme e/ou tecido subcutâneo.
- (D) Drenagem insuficiente da linfa na área lesada.
- (E) Doença associada à obesidade.

**— QUESTÃO 09 —**

Em pacientes com melanoma com índice de Breslow = 0,70mm, tratado cirurgicamente, a taxa de sobrevida por um período de 5 anos é de:

- (A) 30%.
- (B) 50%.
- (C) 65%.
- (D) 80%.
- (E) 95%.

**— QUESTÃO 10 —**

O melanoma na gravidez tem:

- (A) Pior prognóstico no primeiro trimestre.
- (B) Maior risco de recidiva.
- (C) Pior prognóstico no último trimestre.
- (D) Prognóstico relacionado à espessura.
- (E) Metástases mais precoces.

**— QUESTÃO 11 —**

Radioterapia é o tratamento de eleição para a seguinte neoplasia cutânea?

- (A) Ca Basocelular.
- (B) Ca Espinocelular.
- (C) Dermatofibrossarcoma Protuberante.
- (D) Lipossarcoma.
- (E) Sarcoma de Kaposi Clássico.

**— QUESTÃO 12 —**

A cloroquina por via oral em doses baixas está indicada no tratamento de:

- (A) Porfiria Cutânea Tardia;
- (B) Psoríase.
- (C) Eczema Disidrosiform;
- (D) Linfoma de Células T.
- (E) L.E.S.

**— QUESTÃO 13 —**

Qual das doenças abaixo se caracteriza por apresentar eritema nodoso uveíte e aftas:

- (A) Síndrome de Reiter.
- (B) Síndrome de Sweet.
- (C) Penfigoide cicatricial.
- (D) Síndrome de Behçet.
- (E) Síndrome de Stevens-Jonson.

**— QUESTÃO 14 —**

Dentre os fatores desencadeadores da psoríase pustulosa generalizada o mais importante é:

- (A) Infecção.
- (B) Gravidez.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Retirada Abrupta de Corticóide sistêmico.
- (E) Drogas tóxicas irritantes como Ditranol.

**— QUESTÃO 15 —**

Em relação ao Ca. Basocelular esclerosante podemos afirmar que:

- (A) Possui um crescimento rápido.
- (B) Apresenta borda bem definida.
- (C) Não se ulcera.
- (D) Apresenta lesões múltiplas.
- (E) Apresenta, com frequência, invasão perineural.

**— QUESTÃO 16 —**

A Malassezia furfur, agente etiológico da P.versicolor, causa hipocromia cutânea por produzir:

- (A) Ácido Azelaico que inibe o efeito da enzima Tirosinase.
- (B) Componentes fenólicos que inibem os melanossomos.
- (C) Parafenilenodiamina que inibe a dopa-oxidase.
- (D) 5-Furocumarínicos que destroem os melanócitos.
- (E) Cloroexidine que transforma o melanossomo III em melanossomo I.

**— QUESTÃO 17 —**

A acantose nigricans maligna está associada principalmente com tumor maligno:

- (A) Melanoma
- (B) Sarcoma de Kaposi
- (C) Adenocarcinoma
- (D) Melanoma maligno
- (E) Osteossarcoma

**— QUESTÃO 18 —**

Os doentes de hanseníase com a forma BT que tenham sorologia positiva para HIV e CD4+ abaixo de 200, evoluirão:

- (A) Sistemáticamente para a forma V
- (B) Para a forma V, em tempo relativamente curto, se apresentarem grande número de lesões
- (C) Com importante acometimento neural e deformidades
- (D) De um modo geral, sem modificações na resistência orgânica ao M.leprae
- (E) Para as formas BV ou V, dependendo da carga viral

**— QUESTÃO 19 —**

Dentre os medicamentos que com frequência provocam manifestações psicóticas estão:

- (A) Aciclovir-tetraciclina-cortisona
- (B) Hidantoína-dapsona-cortisona
- (C) Cortisona-antimaláricos-dapsona
- (D) Dapsona-antimaláricos hidantoína
- (E) Hidantoína-cortisona-aciclovir

**— QUESTÃO 20 —**

A Doença de Cowden, em que está sempre presente o triquilemoma múltiplo, é importante pela alta incidência de :

- (A) Câncer do trato gastrintestinal
- (B) Câncer da mama em mulheres
- (C) Fibromas uterinos
- (D) Câncer do pulmão
- (E) Câncer de bexiga

**— QUESTÃO 21 —**

Paciente com eritema nodoso apresenta ao exame radiológico do tórax, uma adenopatia hilar bilateral (Síndrome de Lofgrén). Isso vem a ser uma expressão de uma doença de base, que é:

- (A) Tuberculose
- (B) Histoplasmose
- (C) Paracoccidiodomicose
- (D) Sarcoidose
- (E) Mononucleose infecciosa

**— QUESTÃO 22 —**

Sobre o edema agudo hemorrágico da infância é incorreto afirmar:

- (A) Localiza-se predominantemente na face e nos membros
- (B) O estado geral da criança geralmente é bom
- (C) A resolução espontânea ocorre em 2 semanas
- (D) É uma vasculite leucocitoclástica
- (E) O tratamento é realizado com corticoterapia

**— QUESTÃO 23 —**

Assinale a alternativa correta:

- (A) O rituximab não tem efeito nos casos de penfigóide bolhoso rebelde ao tratamento
- (B) Para diferenciar o penfigóide bolhoso da epidermólise bolhosa adquirida (EBA), utiliza-se na imunofluorescência indireta o NaCl (split skin), sendo que no penfigóide a fluorescência ocorre predominantemente no teto e na EBA, no assoalho
- (C) A imunofluorescência indireta (IFI) é positiva na dermatite herpetiforme, e, quanto mais grave o quadro clínico, mais altos são os títulos de anticorpos
- (D) No penfigóide bolhoso, as lesões de mucosa bucal ocorrem em 70% dos casos
- (E) Cerca de 20% dos recém-nascidos de mãe com herpes gestacional podem apresentar lesões cutâneas autolimitadas

**— QUESTÃO 24 —**

Assinale a alternativa incorreta:

- (A) No penfigóide bolhoso, as lesões geralmente cicatrizam, embora em alguns casos, ocorram lesões de mília
- (B) A associação do penfigóide bolhoso com neoplasia é descrita, embora duvidosa, pois ambas ocorrem em faixa etária mais alta
- (C) No penfigóide bolhoso, à imunofluorescência indireta, encontra-se IgG3
- (D) No penfigóide bolhoso, também ocorrem depósitos de C3, IgA, IgM e IgE
- (E) A imunomicroscopia eletrônica mostra que o depósito de IG está localizado na lâmina lúcida e hemidesmossomos da ZMB

**— QUESTÃO 25 —**

Em relação ao hidroadenoma papilífero, é correto afirmar que:

- (A) origina-se nos ácinos da glândula sudorípara écrina
- (B) ocorre mais nos indivíduos do sexo masculino
- (C) origina-se no folículo pilossebáceo
- (D) localiza-se principalmente na área anogenital
- (E) não ocorrem recorrências geralmente