

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO 2012
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS E
RECURSOS PRÓPRIOS – 29-10-2011

Medicina do Trabalho

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

MEDICINA DO TRABALHO**— QUESTÃO 01 —**

O conjunto de práticas sanitárias centradas na relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, e nesta com a assistência, constitui a:

- (A) Vigilância Sanitária.
- (B) Vigilância Epidemiológica.
- (C) Vigilância Ambiental em Saúde.
- (D) Vigilância em Saúde do Trabalhador.
- (E) Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

— QUESTÃO 02 —

Entre os agentes descritos como potencialmente capazes de causar danos sobre a fertilidade masculina podemos citar:

- (A) Calor excessivo.
- (B) Radiações não ionizantes.
- (C) Bismuto.
- (D) Tetracloroetileno.
- (E) Ruído excessivo.

— QUESTÃO 03 —

O melhor método para o estabelecimento donexo causal, na ocorrência de um caso suspeito de asma ocupacional é:

- (A) Radiografia de tórax.
- (B) Curva de Peak Flow.
- (C) Espirometria.
- (D) Testes de provocação brônquica.
- (E) Testes cutâneos.

— QUESTÃO 04 —

A ocorrência de câncer gástrico pode estar associada com a exposição ocupacional a:

- (A) Estanho.
- (B) Berílio.
- (C) Carvão mineral.
- (D) Sílica.
- (E) Asbesto.

— QUESTÃO 05 —

O sistema contínuo de medições de rotina com o objetivo de detectar alterações no ambiente é definido como:

- (A) Monitoramento biológico.
- (B) Vigilância ambiental.
- (C) Vigilância em saúde.
- (D) Monitoramento de emissão do poluente.
- (E) Monitoramento ambiental.

— QUESTÃO 06 —

A avaliação da dose realmente recebida pelo trabalhador, a partir de agentes presentes na situação de trabalho, depende de:

- (A) Concentração.
- (B) Intensidade.
- (C) Tempo de exposição.
- (D) Concentração e da intensidade.
- (E) Concentração e do tempo de exposição.

— QUESTÃO 07 —

Ritmo de trabalho excessivo e exigências de produtividade podem ser classificados como sendo fatores de risco:

- (A) Emocionais.
- (B) Psicossociais.
- (C) Mecânicos.
- (D) Físicos.
- (E) Sociais.

— QUESTÃO 08 —

Com relação as medidas preventivas de Medicina do Trabalho especificadas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), marque a alternativa CORRETA:

- (A) O Ministério do Trabalho e Emprego estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos.
- (B) Observando os preceitos da ética médica, o resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, não deverá ser comunicado ao trabalhador.
- (C) O empregador manterá, no estabelecimento, o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, independente do risco da atividade.
- (D) As doenças profissionais e as produzidas em virtude de condições especiais de trabalho não estão incluídas no rol de doenças de notificação obrigatória.
- (E) As despesas relativas à realização dos exames médicos rotineiros são de responsabilidade do empregador, exceto aquelas que dizem respeito aos exames laboratoriais complementares.

— QUESTÃO 09 —

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme estabelecido na NR-07, deve incluir a realização obrigatória de algumas modalidades de exames médicos ocupacionais.

Neste enfoque, marque o exame médico que não tem a obrigatoriedade da sua realização exigida:

- (A) Periódico.
- (B) De retorno ao trabalho.
- (C) De mudança de função.
- (D) De remoção.
- (E) Demissional.

— QUESTÃO 10

Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além do exame clínico e dos exames complementares deve o médico também considerar outras situações. Após análise das premissas a seguir, marque a alternativa correta:

- (A) Analisar a história clínica e ocupacional do trabalhador.
- (B) Fazer o estudo da organização do trabalho.
- (C) Analisar os dados epidemiológicos.
- (D) Considerar o depoimento e a experiência dos trabalhadores.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

— QUESTÃO 11

A NR (Norma Regulamentadora), de número 17 em seu anexo II se aplica em:

- (A) Trabalhadores em Segurança e Serviço de Saúde.
- (B) Trabalhadores com atividades em operações perigosas.
- (C) Trabalhadores da construção civil.
- (D) Trabalhadores no serviço de fiscalização e penalidades.
- (E) Trabalhadores em serviço de tele-atendimento/tele-marketing.

— QUESTÃO 12

A Síndrome do Pronador Redondo é caracterizada pela compressão do nervo:

- (A) Radial no dorso da mão.
- (B) Ulnar ao nível do cotovelo.
- (C) Ulnar ao nível do punho.
- (D) Mediano abaixo da prega do cotovelo.
- (E) Mediano ao nível do túnel do carpo.

— QUESTÃO 13

De acordo com a legislação, a elaboração, implantação e acompanhamento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), é obrigação do:

- (A) Médico do Trabalho.
- (B) CEREST (Centro de Referência da Saúde do Trabalhador).
- (C) Empresa.
- (D) Sindicato dos Trabalhadores da categoria.
- (E) DRT (Delegacia Regional do Trabalho).

— QUESTÃO 14

A DL 50% (Dose Letal 50%), de uma substância química indica:

- (A) Aproximadamente 50% do valor do limite de tolerância.
- (B) A dose mínima capaz de matar 50% dos animais de um experimento.

(C) 50% da toxicidade aguda ou crônica da substância capaz de agravar a saúde dos animais de um experimento.

(D) A metade da toxicidade aguda da substância.

(E) 50% da toxicidade crônica na população em estudo.

— QUESTÃO 15

O número de doença ocupacional em uma população em um determinado período de tempo pode ser medido por:

- (A) Taxa de frequência.
- (B) Taxa de incidência.
- (C) Taxa de prevalência.
- (D) Taxa de gravidade.
- (E) Taxa de absenteísmo.

— QUESTÃO 16

Para a realização de um exame audiométrico (audiograma), é necessário repouso acústico de, no mínimo:

- (A) 12 horas.
- (B) 8 horas.
- (C) 12 a 14 horas.
- (D) 8 a 12 horas.
- (E) 14 horas.

— QUESTÃO 17

Utiliza-se para realização de parâmetros de evolução de PAIR em um audiograma em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, o aumento da média nas frequências 3000, 4000 e 6000 Hertz e frequência aguda isolada, igual ou acima de, respectivamente:

- (A) 10 e 15 dB.
- (B) 15 e 10 dB.
- (C) 20 e 35 dB.
- (D) 15 e 25 dB.
- (E) Nenhuma das anteriores.

— QUESTÃO 18

Emprega-se como antídoto para a ingestão acidental de Álcool Metílico (metanol):

- (A) Agentes quelantes.
- (B) Carvão ativado.
- (C) Agentes metahemoglobinizantes por via venosa.
- (D) Agente metahemoglobinizantes por via inalatória.
- (E) Álcool etílico.

— QUESTÃO 19

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) de número 04, não se integra ao SESMT:

- (A) Engenheiro de Segurança do Trabalho.
- (B) Técnico de Segurança do Trabalho.
- (C) Fonoaudiólogo.
- (D) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.
- (E) Médico do Trabalho.

— QUESTÃO 20

Para o diagnóstico das PNEUMOCONIOSES é essencial:

- (A) Raios X de tórax e espirometria.
- (B) História Ocupacional e Raios X de tórax.
- (C) Raios X de tórax e lavado bronco alveolar.
- (D) Biopsia transbrônquica e curvas de “peak-flow”.
- (E) Todas estão corretas.

— QUESTÃO 21

O ASO emitido em Exame Periódico de uma empresa galvanotécnica (cromagem e niquelagem), poderá ser utilizado em demissional por um período após sua emissão de até:

- (A) 90 dias.
- (B) 120 dias.
- (C) 135 dias.
- (D) 90 dias, se a última Audiometria estiver normal.
- (E) Deverá se submeter a Exame Demissional.

— QUESTÃO 22

Dentre os sinais e sintomas da Síndrome do Burnout podemos encontrar:

- (A) Cansaço, mal estar geral e alterações do sono.
- (B) Baixa da auto estima e agressividade para com os colegas de trabalho e familiares.
- (C) Aumento do consumo de café, álcool, fármacos e drogas ilegais.
- (D) Palpitações, desordens gastrintestinais e perda de peso.
- (E) Todas alternativas estão corretas.

— QUESTÃO 23

Em relação a Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR:

- (A) No Audiograma típico de PAIR, observamos inicialmente comprometimento nas frequências de 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.
- (B) Na PAIR relacionada ao trabalho, torna a orelha mais sensível ao ruído em futuras exposições.
- (C) Mesmo cessando a exposição ao ruído, haverá piora da PAIR, nos 10 anos seguintes.
- (D) A PAIR é irreversível e sempre similar bilateralmente.
- (E) A exposição simultânea a determinados produtos químicos e vibrações pode agravar uma PAIR relacionada ao trabalho.

— QUESTÃO 24

Quanto ao tempo de guarda dos Prontuários Médicos, os mesmos deverão ser mantidos por:

- (A) 20 anos independente do grau de risco da empresa.
- (B) 10 anos para empresas de grau de risco 1 e 2.
- (C) 20 anos para empresas de grau de risco 3 e 4.
- (D) Letras B e C estão corretas.
- (E) Todas estão incorretas.

— QUESTÃO 25

Quanto a doenças como Asbestose, Bissinose e Silicose, podemos dizer que se tratam de:

- (A) Doenças do Trabalho.
- (B) Doenças profissionais.
- (C) Doenças que podem não estarem relacionadas ao trabalho.
- (D) Doenças relacionadas à suscetibilidade individual.
- (E) Concausalidades.