

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO 2012
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS E
RECURSOS PRÓPRIOS – 29-10-2011

Vacinas

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

VACINAS**— QUESTÃO 01 —**

As vacinas que contém agentes vivos, se não forem administradas de forma simultânea, precisa aguardar um intervalo para ser aplicada. Evitando assim uma interferência na replicação dos agentes atenuados. Qual é o intervalo necessário?

- (A) Sete dias.
- (B) Trinta dias.
- (C) Seis meses.
- (D) Um ano.
- (E) Duas semanas.

— QUESTÃO 02 —

Quais são as vacinas de vírus atenuados (vivos)? Marque a opção correta:

- (A) Hepatite B, Febre Amarela, Meningite C.
- (B) Pneumocócica 23, Varicela, BCG, Pneumococo 13v.
- (C) Tríplice Viral, Varicela, Febre Amarela, Rotavírus, Póliomelite (Sabin).
- (D) HPV, Hepatite A, Pentavalente.
- (E) Varicela, Hepatite B, Tétano, BCG.

— QUESTÃO 03 —

Os viajantes podem ficar expostos às doenças infecciosas de muitas formas, estreitamente relacionadas aos mecanismos de transmissão de microorganismo. Portanto ao embarcar para outros países a ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) exige que sejam administradas algumas vacinas, quais são elas?

- (A) Hepatite B, Hepatite A, Febre Amarela, Cólera e Influenza.
- (B) BCG, Rotavírus, Hepatite A, HPV.
- (C) Difteria e Tétano (dT) e Hepatite B.
- (D) Meningite C, Pneumocócica, Tríplice Viral e BCG.
- (E) Pneumocócica e Rotavírus.

— QUESTÃO 04 —

As vacinas podem ser classificadas de acordo com as características dos antígenos que a compõem. Dentre as diferentes vacinas existentes podemos classificar a vacina anti-HPV como:

- (A) Inativada.
- (B) Atenuada.
- (C) Modificada.
- (D) Subunidades.
- (E) Associada.

— QUESTÃO 05 —

A vacinação contra tuberculose é indicada desde o nascimento da criança. Antes da sua administração devemos atentar a alguns detalhes do recém-nascido como o peso e a existência de algumas doenças. Sendo esta contra indicada nos casos:

- (A) Peso inferior a 2.000g e Rn HIV positivo.
- (B) Peso acima de 2.000g.
- (C) Mãe tuberculosa e Rn icterico.
- (D) Rn imunodeprimido com peso acima de 2.000g.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

— QUESTÃO 06 —

A.D.N, dois anos, chega à unidade de saúde acompanhada dos pais para campanha de vacinação. Os responsáveis relatam ao profissional de saúde que a criança é alérgica a proteína do ovo. Nesse caso a criança devesse realizar teste alérgico para quais vacinas?

- (A) BCG, Hepatite B e Febre Amarela.
- (B) Febre Amarela, Influenza e Tríplice Viral.
- (C) Hepatite B, Hepatite A e Sarampo.
- (D) DTP, Febre Amarela e Rotavírus.
- (E) Pólio, Rotavirus e Tríplice Viral.

— QUESTÃO 07 —

J.N.P, seis meses de idade, chega à Clínica acompanhado dos pais para ser vacinado contra Influenza/2011. Qual devesse ser o esquema vacinal?

- (A) Uma dose de 0,5 ml.
- (B) Duas doses de 0,5 ml.
- (C) Três doses de 0,25 ml.
- (D) Duas doses de 0,25 ml.
- (E) Uma dose de 0,25ml.

— QUESTÃO 08 —

A.D.N, seis anos de idade, chega à Clínica acompanhado dos pais para receber a vacina contra Influenza/2011. O caderno de vacinação da criança encontra-se completo, com histórico de vacinação primária contra H1N1 no ano anterior realizado na rede pública. Como procederá o esquema vacinal desse ano?

- (A) Aplicar apenas uma dose de 0,5ml.
- (B) A criança não devesse receber a vacina novamente.
- (C) Aplicar duas doses de 0,25ml.
- (D) Aplicar duas doses de 0,5ml.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

— QUESTÃO 09

A partir de abril de 2010, foi incorporada no Calendário Básico de Vacinação a vacina Pneumocócica Conjugada 10 valente. Esta vacina poderá ser administrada assim como a Pneumocócica Conjugada 13 valente (rede privada) a partir de:

- (A) 4 meses.
- (B) 2 meses.
- (C) 9 meses.
- (D) 6 meses.
- (E) 12 meses.

— QUESTÃO 10

O esquema vacinal para mulheres gestantes deve excluir a vacina:

- (A) Anti-influenza conjugada.
- (B) Anti Tetânica.
- (C) Anti-HPV.
- (D) Anti-Hepatite A.
- (E) Anti-Gripal H1N1.

— QUESTÃO 11

A vacina contra hepatite B deve ser orientada para aplicação em todos os indivíduos cujos marcadores imunológicos sejam:

- (A) Anti HBs reagente; HBsag não reagente e Anti HBc IgG reagente.
- (B) Anti HBe reagente, HBeag não reagente e HBsag reagente.
- (C) HBsag reagente, Anti HBsag não reagente e Anti HBc IgM não reagente.
- (D) HBsag não reagente, Anti HBcIg não reagente e Anti HBc IgM não reagente.
- (E) Anti HBs não reagente, Anti HBe reagente e HBeag não reagente.

— QUESTÃO 12

A vacina contra o HPV protege a mulher contra os tipos virais mais prevalentes relacionados ao câncer de colo uterino, vaginal e vulvar que são:

- (A) HPV 3 e 4.
- (B) HPV 6 e 11.
- (C) HPV 5 e 45.
- (D) HPV 16 e 18.
- (E) HPV 6 e 25.

— QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que contém somente vacinas produzidas com vírus vivos atenuados:

- (A) Salk, Sabin e HPV.
- (B) Sabin, Anti-Sarampo e HPV.
- (C) Anti-Sarampo, Febre Amarela e Anti-Varicela.
- (D) Anti-Hepatite A, Anti-Hepatite B e Anti-Sarampo.
- (E) Anti-Caxumba, Rotavírus 1 e 2 e BCG Percutânea.

— QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que contenha somente vacinas que não exijam dose de reforço:

- (A) Hepatite B e Hepatite A.
- (B) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- (C) Meningococo C conjugada.
- (D) Febre Amarela.
- (E) Varicela e Rotavírus.

— QUESTÃO 15

Crianças nascidas de mães portadoras de HIV devem ser protegidas com as seguintes vacinas até o segundo mês de vida:

- (A) Sabin, D.P. Ta, Pneumo 10 valentes.
- (B) Salk, D.P. Ta, vacina contra Haemofilus influenza tipo B e Pneumo 10 valentes.
- (C) Salk, Rotavírus, D.P.Ta e vacina contra Haemofilus influenza tipo B.
- (D) Sabin, Rotavírus, D.P.Ta e vacina contra Haemofilus influenza tipo B.
- (E) Salk, BCGp, D.P.Ta e vacina contra Haemofilus influenza tipo B.

— QUESTÃO 16

A idade adequada para vacinação de Hepatite A é a partir de:

- (A) 4 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 9 meses.
- (D) 12 meses.
- (E) 18 meses.

— QUESTÃO 17

Qual das seguintes vacinas devem ser feitas ao nascer, de acordo com ministério da saúde?

- (A) Pólio e Febre Amarela.
- (B) BCG e Hepatite C.
- (C) BCG e Hepatite A.
- (D) Hepatite B (3 doses) +BCG.
- (E) Hepatite B(1dose)+BCG.

— QUESTÃO 18

É incorreto afirmar:

- (A) A gestante não deve receber a vacina para Hepatite B, pois a mesma é de vírus vivo atenuado.
- (B) O paciente HIV+ não pode receber a vacina para Febre Amarela, principalmente se o CD4 for baixo (<200).
- (C) A vacina da Febre Amarela é contra indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando (SUS-2011).
- (D) Vacinas recomendadas para o idoso são: Hepatite B, Febre Amarela, Influenza sazonal, Pneumo-23, d T.
- (E) Hepatite B (são 3 doses).

— QUESTÃO 19

É correto afirmar:

- (A) BCG (bactéria morta).
- (B) BCG (bactéria viva atenuada).
- (C) BCG (fragmento da bactéria).
- (D) Vacina da Febre Amarela é de vírus morto.
- (E) As vacinas de vírus e bactérias vivas (atenuadas) devem ser feitas em pacientes com AIDS, visando sua melhor proteção, uma vez que são imunodeprimidos.

— QUESTÃO 20

Sobre as vacinas, não fazem parte do PNI (2011):

- (A) Meningo A e B.
- (B) Febre Amarela.
- (C) Tétano.
- (D) BCG.
- (E) Difteria.

— QUESTÃO 21

Quais as vacinas que devem ser feitas no paciente idoso com AIDS, de acordo com o Ministério da Saúde?

- (A) Febre amarela e BCG.
- (B) Hepatite A e B, Pneumocácia, Hemófilo e Influenza Sazonal.
- (C) Febre Amarela e Hepatite B.
- (D) BCG, Hepatite A e B, Pneumocócica e Hemófilo.
- (E) Apenas Febre Amarela.

— QUESTÃO 22

Sobre a vacina da Febre Amarela, é correto afirmar:

- (A) É feita aos 9 meses e aos 10 anos, sendo repetida de 10 em 10 anos (para pessoas com maior risco de exposição).
- (B) Deve ser feita em pacientes jovens com AIDS.
- (C) É de vírus morto.
- (D) Pode ser feita com segurança em pacientes após Quimioterapia.
- (E) Protege contra Dengue, além da própria Febre Amarela.

— QUESTÃO 23

São doenças de notificação compulsória no Brasil:

- (A) Doença meningocócica, infecção por MRSA, coqueluche, dengue e malária.
- (B) Botulismo, esquistossomose, hanseníase, febre maculosa e doença de Chagas.
- (C) Febre amarela, difteria, leishmaniose visceral, tracoma e sífilis congênita.
- (D) Cólera, hantaviruses, hepatites virais, doença pneumocócica e febre tifóide.
- (E) Ttoxoplasmose, paralisia flácida aguda, AIDS, sarampo e SRAG.

— QUESTÃO 24

Das abaixo, geralmente apresenta-se apenas sob a forma crônica:

- (A) Hepatite A.
- (B) Hepatite B.
- (C) Hepatite C.
- (D) Hepatite D.
- (E) Hepatite E.

— QUESTÃO 25

Dentre as doenças de notificação compulsória relacionadas, assinale a que deve ser de notificação semanal:

- (A) Tétano.
- (B) Difteria.
- (C) Diarréia.
- (D) Sarampo.
- (E) Poliomielite.