

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO 2013
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS RECURSOS
E SERVIÇOS PRÓPRIOS
20 de outubro de 2012

Centro de Vacinação

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

CENTRO DE VACINAÇÃO

— QUESTÃO 01 —

A anafilaxia é a mais grave das condições alérgicas, podendo levar ao óbito rapidamente pessoa previamente saudável. De acordo com a afirmativa superior, quais os critérios diagnósticos que se pode considerar que uma pessoa possa estar tendo uma anafilaxia? Leia e analise as assertivas abaixo.

- (A) Início agudo com comprometimento de pele/mucosas e comprometimento respiratório ou hipotensão/colapso.
- (B) Comprometimento de dois ou mais sistemas (pele/mucosa, respiratório, hipotensão/colapso ou alterações gastrointestinais) após exposição a provável alérgeno.
- (C) Hipotensão arterial após exposição a alérgeno conhecido.
- (D) Todas as alternativas acima são critérios diagnósticos para ter anafilaxia.

— QUESTÃO 02 —

A profilaxia do tétano neonatorum, está essencialmente baseada em:

- (A) Educação sanitária, exclusivamente.
- (B) Parto hospitalar, exclusivamente.
- (C) Vacinação das gestantes a partir do 5º mês de gestação.
- (D) Assepsia total no cuidado com o neonato.

— QUESTÃO 03 —

Um surto de rubéola ocorreu em 2006 em Belo Horizonte, colocando em risco principalmente o feto de gestantes susceptíveis à infecção. Em relação à vacinação tríplice viral, que oferece proteção contra sarampo, caxumba e rubéola pode-se afirmar corretamente que:

- (A) em adultos susceptíveis, a segunda dose pode ser dada a qualquer momento a partir de 28 dias da primeira dose.
- (B) está indicada para gestantes a partir do segundo semestre de gestação.
- (C) está absolutamente contra-indicada em pessoas que têm alergia a ovo.
- (D) o esquema básico na infância é composto por duas doses, com a primeira dose sendo aplicada aos 9 meses de vida.

— QUESTÃO 04 —

Em relação a Varicela é correto afirmar que:

- (A) a varicela e o herpes-zóster são duas diferentes síndromes clínicas com diferentes agentes etiológicos.
- (B) o período de incubação da varicela compreende a viremia primária e secundária e vai desde a exposição até o início do exantema (rash) cutâneo e, gira em torno de 2 a 10 dias com média de 8 dias.

(C) a varicela caracteriza-se por uma erupção generalizada de distribuição centrípeta, onde máculas eritematosas, pápulas, vesículas e lesões escoriadas podem estar presentes, ao mesmo tempo.

(D) não há necessidade de isolar o paciente com varicela.

— QUESTÃO 05 —

Quanto as chamadas “doenças próprias da infância”, afirma-se:

I. Tanto a caxumba quanto a coqueluche possuem imunidade adquirida permanente, não diminuindo ao longo do tempo e não sendo possível novo quadro infeccioso.

II. O sarampo é uma infecção com possibilidade de complicações, estando entre as mais frequentes a otite média, sinusite e pneumonia.

III. O exantema súbito caracteriza-se por uma erupção maculo-papular rósea que permanece por não mais que 48 horas, seguida de um período febril de 3 a 4 dias; afeta principalmente crianças entre 3 a 5 anos.

IV. O primeiro sintoma da rubéola em crianças costuma ser a erupção cutânea e é característico o exantema não durar mais de 3 dias.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.

— QUESTÃO 06 —

Caso não haja contra-indicação assinale a alternativa que contenha vacinas que podem ser feitas no recém-nascido:

- (A) Pólio oral e BCG.
- (B) Pneumococo e hepatite A.
- (C) Hepatite A e B.
- (D) Tríplice viral.

— QUESTÃO 07 —

São indicações da vacina antipneumocócica, exceto:

- (A) Fístula liquórica.
- (B) Trabalhadores da área da saúde.
- (C) Linfoma.
- (D) Esplenectomia.

— QUESTÃO 08

Um recém-nascido, filho de mãe portadora do vírus HIV, nasce a termo em boas condições de vitalidade. A parturiente realizou pré-natal adequado, exceto por não ter recebido vacinação antitetânica. A pesquisa de hepatite B materna foi negativa. A prescrição, realizada ao nascer deve conter, além da zidovudina (AZT):

- (A) vacina antitetânica, vacina para hepatite B e BCG.
- (B) imunoglobulina antitetânica, vacinação para hepatite B e BCG.
- (C) imunoglobulina antitetânica e imunoglobulina para hepatite B.
- (D) vacinação para hepatite B e BCG.

— QUESTÃO 09

Adolescente grávida, com vacinação em dia, mas que tenha recebido a última dose de reforço da vacina DT (contra difteria e tétano) há mais de cinco anos. Diante desse caso, em relação à vacina DT, a recomendação é:

- (A) nova dose de reforço.
- (B) não há necessidade de revacinação.
- (C) receber dose de reforço de 10 em 10 anos.
- (D) receber dose de reforço apenas em caso de ferimento grave.

— QUESTÃO 10

Mãe procura atendimento médico porque sua filha de 3 meses de vida ainda mantém pequena úlcera no local onde foi aplicada a vacina BCG logo ao nascer. Qual deverá ser a melhor conduta?

- (A) Expectante.
- (B) Iniciar isoniazida.
- (C) Solicitar PPD.
- (D) Hemograma completo.

— QUESTÃO 11

Se houver indicação, não existe limite superior de idade para aplicação de vacinas, com exceção da(s) vacina(s):

- (A) Vacina contra Influenza.
- (B) Vacina contra pneumococo.
- (C) Vacina contra febre amarela.
- (D) Vacina tríplice (DTP) de células inteiras e dupla tipo infantil.

— QUESTÃO 12

O calendário vacinal da criança preconiza que:

- (A) a primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido.
- (B) é possível administrar a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano a partir de 15 dias de idade.
- (C) a vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 6 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica.
- (D) o intervalo mínimo preconizado entre a primeira e segunda dose da vacina oral de rotavírus humano é de 4 semanas.

— QUESTÃO 13

O esquema vacinal indicado para imunização de todos os adultos e idosos a partir dos 20 anos, que não tiverem comprovação de vacinação anterior, é:

- (A) vacina dT, 2 doses com intervalo de 2 meses entre as doses e reforço a cada dez anos.
- (B) vacina tríplice viral - SCR (sarampo, caxumba e rubéola), em dose única.
- (C) vacina contra pneumococo, dose anual, durante a Campanha Nacional de Vacinação.
- (D) vacina contra influenza, dose única, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.

— QUESTÃO 14

Em relação às normas vigentes para notificação de casos da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, é correto afirmar que:

- (A) todos os resultados positivos das doenças e agravos constantes da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória devem ser notificadas de forma imediata pelos Laboratórios de Saúde Pública dos Estados.
- (B) a notificação de alteração no padrão epidemiológico de doença conhecida, independente de constar na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória é obrigatória.
- (C) é permitida a exclusão de doenças e agravos da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória pelos gestores municipais e estaduais do SUS onde não haja ocorrência da doença ou agravo há mais de vinte anos.
- (D) os agravos de notificação imediata devem ser notificados em, no máximo, 48 horas a partir do momento da suspeita inicial.

— QUESTÃO 15

Assinale a doença listada abaixo que não é considerada de notificação compulsória nacional, segundo a Portaria SVS/MS N.º 05 de 21 de fevereiro de 2006:

- (A) hepatites virais.
- (B) sífilis congênita.
- (C) tracoma.
- (D) tularemia.

— QUESTÃO 16

A vacina contra Febre Amarela está indicada para crianças que residem ou que irão viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial da doença:

- (A) a partir de 6 meses de idade.
- (B) a partir dos 9 meses de idade.
- (C) a partir de 3 meses de idade.
- (D) no 1º mês de vida.

— QUESTÃO 17

Um adolescente que visite o Centro de Vacinação Unimed pela primeira vez, sem apresentar comprovação de vacina anterior, deve ser imunizado contra:

- (A) difteria, tétano, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B.
- (B) difteria, tétano, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B e febre amarela.
- (C) difteria, tétano, sarampo, rubéola, hepatite B e febre amarela.
- (D) difteria, tétano, sarampo, rubéola, hepatite B.

— QUESTÃO 18

Indivíduos com 60 anos e mais, residentes em qualquer lugar do país e que não tiverem comprovação de nenhuma vacinação anterior, devem ser imunizados com:

- (A) dT, SR, influenza anual e pneumococo.
- (B) dT, SR, influenza anual e pneumococo, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas.
- (C) dT, influenza anual e pneumococo, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas.
- (D) influenza anual e pneumococo.

— QUESTÃO 19

Para um recém-nascido que é contato de paciente com tuberculose bacilífera, a conduta adotada é:

- (A) quimioprofilaxia prévia e depois vacinação BCG se o PPD for não reator.
- (B) vacinação BCG ainda na maternidade.
- (C) somente quimioprofilaxia se PPD for não reator.
- (D) BCG e após quimioprofilaxia.

— QUESTÃO 20

Um indivíduo adulto sofreu um ferimento limpo e superficial. Sua história vacinal mostra que a vacinação antitetânica está em dia. Nesse caso, deve-se indicar:

- (A) vacina e soro antitetânico.
- (B) somente vacina antitetânica.
- (C) somente soro antitetânico.
- (D) não estão indicados nem vacina nem soro antitetânico.

— QUESTÃO 21

São doenças de notificação compulsória em todo o território nacional:

- (A) Febre reumática, febre amarela, sarampo, difteria, tétano.
- (B) Escabiose, febre amarela, hanseníase, doença de Chagas.
- (C) Febre amarela, tuberculose, hanseníase, difteria, raiva humana.
- (D) Poliomielite, coqueluche, malária, amidalite estreptocócica.

— QUESTÃO 22

A temperatura recomendada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde para o acondicionamento de vacinas em refrigerador a nível local, Unidades de Saúde, é entre:

- (A) + 2°C a + 8°C.
- (B) + 2°C a + 10°C.
- (C) + 4°C a + 8°C.
- (D) + 4°C a + 10°C.

— QUESTÃO 23

“No dia 18 de agosto deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte recebeu a notificação de 13 possíveis casos de rubéola, em funcionários de uma empresa de microinformática, localizada no centro da cidade” (SES/MG).

As medidas de vigilância e controle adotadas foram, EXCETO:

- (A) Bloqueio vacinal seletivo, de acordo com as normas do Ministério Saúde, para os contatos mais íntimos dos casos suspeitos, evitando a vacinação indiscriminada.
- (B) Vacinação dos casos suspeitos.
- (C) Intensificação da vacinação de rotina, para as faixas etárias suscetíveis.
- (D) Administração da vacina triviral nas mulheres de 12 a 49 anos e nos homens até 39 anos sem cobertura vacinal.

— QUESTÃO 24

Doença de notificação compulsória, em mulheres é uma das maiores causas de infertilidade no mundo. Trata-se:

- (A) Gonorréia.
- (B) Cancro mole.
- (C) Donovanose.
- (D) Cancro duro.

— QUESTÃO 25

A vacina oral contra rotavirus foi recentemente incorporada ao calendário básico de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunizações. De acordo com esse calendário, a vacina contra rotavirus deve ser aplicada aos:

- (A) 2, 4 e 6 meses de idade, somente.
- (B) 2, 4 e 6 meses com reforço aos 12 meses de idade.
- (C) 1, 2 e 6 meses de idade.
- (D) 2 e 4 meses de idade, somente.