

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO 2013
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS RECURSOS
E SERVIÇOS PRÓPRIOS
20 de outubro de 2012

Oftalmologia

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

OFTALMOLOGIA

— QUESTÃO 01 —

Qual dos ossos a seguir não faz parte do assoalho orbital?

- (A) Maxilar.
- (B) Lacrimal.
- (C) Zigomático.
- (D) Palatino.

— QUESTÃO 02 —

Qual músculo se insere o mais posterior possível em relação ao limbo?

- (A) Reto Medial.
- (B) Reto Superior.
- (C) Reto Inferior.
- (D) Obliquo Superior.

— QUESTÃO 03 —

A linha cinzenta da pálpebra é:

- (A) a junção mucocutânea da margem da pálpebra.
- (B) a localização dos orifícios da glândula meibomiana.
- (C) o músculo de Riolan.
- (D) posterior ao tarso.

— QUESTÃO 04 —

A distancia de 6 metros, as menores letras que uma criança de 9 anos consegue ler ficam na linha 20/60. Você pede para ela andar em direção ao gráfico. Quanto ela andará antes de conseguir ler a linha 20/20?

- (A) 4,5m.
- (B) 2,1m.
- (C) 4,0m.
- (D) 1,5m.

— QUESTÃO 05 —

Você usa um teste duocromo para refinar a refração de um paciente. Ele diz que as letras vermelhas estão mais nítidas que as verdes. Esse paciente está:

- (A) acomodando.
- (B) não-acomodando.
- (C) anisométrico.
- (D) presbiópico.

— QUESTÃO 06 —

Qual par craniano é lesado com mais freqüência em um traumatismo craniano fechado?

- (A) III par craniano.
- (B) II par craniano.
- (C) IV par craniano.
- (D) VI par craniano.

— QUESTÃO 07 —

As pulsações oculares podem ser vistas em todos os quadros a seguir, exceto em:

- (A) neurofibromatose.
- (B) fístula no seio carotidocavernoso.
- (C) orbitoencefalocele.
- (D) hemangioma capilar.

— QUESTÃO 08 —

A uveíte intermediária pode ser associada a todas as patologias que se seguem, exceto:

- (A) doença de Lyme.
- (B) esclerose múltipla.
- (C) sarcoidose.
- (D) sífilis.

— QUESTÃO 09 —

Uma pan-uveíte aguda bilateral com perda visual grave e olhos vermelhos, inflamados e dolorosos, é mais bem tratada sistemicamente com:

- (A) ciclosporina.
- (B) Corticosteroides.
- (C) azatioprina.
- (D) clorambucil.

— QUESTÃO 10 —

Qual a melhor terapia inicial para o glaucoma maligno?

- (A) Pilocarpina a 2%.
- (B) Iridotomia a laser.
- (C) Terapia midriático-ciclopégica.
- (D) Remoção do cristalino.

— QUESTÃO 11

A neuropatia óptica glaucomatosa é associada a lesão de quais tipos de células retinianas?

- (A) células amácrinas.
- (B) células ganglionares.
- (C) células bipolares.
- (D) fotorreceptoras.

— QUESTÃO 12

A tonometria indentada dá leituras falsamente baixas sob as condições que se seguem, exceto:

- (A) alta miopia.
- (B) decréscimo da espessura da córnea central.
- (C) fluoresceína excessiva.
- (D) astigmatismo com a regra maior do que 3D.

— QUESTÃO 13

Os análogos de prostaglandina abaixam a PIO predominantemente por qual dos mecanismos seguintes?

- (A) aumento do efluxo uveoescleral.
- (B) facilita o efluxo aquoso, estimulando a contração dos músculos ciliares.
- (C) reduz o volume vítreo.
- (D) reduz a produção aquosa.

— QUESTÃO 14

Qual das seguintes doenças não é causada pela *Clamidia trachomatis*?

- (A) Conjuntivite lenhosa.
- (B) Conjuntivite de inclusão de adultos.
- (C) Linfocoma venéreo.
- (D) Trachoma.

— QUESTÃO 15

Qual microorganismo não é um comensal comumente encontrado nas pálpebras e supercílios?

- (A) *Moraxella catarrhalis*.
- (B) *Haemophilus influenzae*.
- (C) *Propionibacterium acnes*.
- (D) *Staphylococcus epidermidis*.

— QUESTÃO 16

Qual é o tumor epitelial maligno mais comum da conjuntiva?

- (A) Carcinoma de células basais.
- (B) Carcinoma de células escamosas.
- (C) Melanoma maligno.
- (D) Papiloma escamoso.

— QUESTÃO 17

Todas as seguintes drogas podem causar córnea verticillata, exceto:

- (A) amiodarona.
- (B) lítio.
- (C) cloroquina.
- (D) indometacina.

— QUESTÃO 18

Qual das seguintes formas de esclerite é a mais destrutiva?

- (A) Esclerite anterior difusa.
- (B) Esclerite necrosante com inflamação.
- (C) Esclerite anterior nodular.
- (D) Escleromalácia perforante.

— QUESTÃO 19

Qual é a mais comum das distrofias corneanas abaixo?

- (A) Distrofia estromal em treliça.
- (B) Distrofia estromal lacunar.
- (C) Distrofia estromal granulosa.
- (D) Distrofia de Meesmann.

— QUESTÃO 20

As características de um ceratoacantoma incluem todas as opções a seguir, exceto:

- (A) resolução espontânea.
- (B) perda dos cílios.
- (C) cratera ulcerada e cheia de lipídios.
- (D) crescimento rápido.

— QUESTÃO 21

No quadro de obstrução adquirida do sistema nasolacrimal, onde o bloqueio se localiza com mais frequência?

- (A) canalículos.
- (B) saco nasolacrimal.
- (C) ducto nasolacrimal.
- (D) corneto inferior.

— QUESTÃO 22

O diagnóstico diferencial de um paciente com leucocoria inclui todos os seguintes, exceto:

- (A) retinoblastoma.
- (B) retinopatia da prematuridade.
- (C) homocistinúria.
- (D) doença de Coats.

— QUESTÃO 23

Em uma oclusão da veia central da retina (OVCR) não-perfundida, qual é o tempo mais apropriado para fazer a fotocoagulação pan-retiniana (FPR)?

- (A) logo que possível depois da oclusão da veia.
- (B) quando existir desenvolvimento de neovascularização de qualquer tipo.
- (C) se existir edema macular.
- (D) depois da absorção das hemorragias retinianas.

— QUESTÃO 24

Qual camada da retina que responde pela aparência cística petaloide do edema macular cistoide (EMC)?

- (A) camada de fibras nervosas.
- (B) camada plexiforme interna.
- (C) camada plexiforme externa.
- (D) camada nuclear externa.

— QUESTÃO 25

Que complicação ocular poderia resultar depois de uma oclusão da artéria central da retina?

- (A) Edema de córnea.
- (B) Estafiloma.
- (C) Rubeose da íris.
- (D) Membrana neovascular coroidiana.