

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO 2013
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS RECURSOS
E SERVIÇOS PRÓPRIOS
20 de outubro de 2012

Ortopedia e Traumatologia

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

— QUESTÃO 01 —

Uma criança de 9 anos, sofreu ferimento no calcânhar direito há 10 dias. Há 4 dias, faz queixa de dor local progressiva, edema leve, hiperemia e aumento de calor local, associado à adinamia, hiporexia e febre (38°). A radiografia simples do pé é normal. Cintilografia do calcâneo com tc mostra aumento de captação na tuberosidade do calcâneo.

O diagnóstico e o agente etiológico mais prováveis são:

- (A) piodartrite; pseudomonas aeruginosa.
- (B) osteomielite ; Candida sp.
- (C) osteomielite; Staphylococcus aureus.
- (D) osteomielite ; pseudomonas aeruginosa.

— QUESTÃO 02 —

No hálux valgo do adulto com ângulo metatarsofalângico superior a 35 graus, ocorre:

- (A) supinação do hálux.
- (B) relaxamento do músculo flexor curto do hálux.
- (C) migração plantar do músculo abductor do hálux.
- (D) desvio medial dos sesamoides do hálux.

— QUESTÃO 03 —

Quanto à anatomia patológica das fraturas do colo do fêmur, é correto afirmar que :

- (A) quanto mais proximal for a fratura melhor será o prognóstico.
- (B) as fraturas basocervicais são mal vascularizadas.
- (C) as fraturas subcapitais e mediocervicais são intracapsulares .
- (D) a principal irrigação da cabeça do fêmur é feita pelos vasos retinaculares que penetram pelo colo.

— QUESTÃO 04 —

Na artropatia de CHARCOT envolvendo o pé, a articulação mais comumente acometida é a:

- (A) subtalar.
- (B) talonavicular.
- (C) calcaneocuboidea.
- (D) tarsometatarsal.

— QUESTÃO 05 —

Paciente de 20 anos, vítima de acidente de moto há duas horas, chega ao PS hemodinamicamente estável, Glasgow= 15, eupneico, com fratura exposta tipo Gustillo III A do 1/3 médio da perna direita, sem lesão vascular. Qual o melhor tratamento ortopédico inicial, após limpeza cirúrgica, debridamento e antibioticoterapia intravenosa?

- (A) Instalação de fixador externo de Ilizarov associado a enxerto ósseo autólogo.
- (B) Tração esquelética calcaneana para alinhar a fratura e tratamento definitivo após cicatrização da ferida.
- (C) Redução cruenta e fixação com placa e parafusos.
- (D) Instalação de fixador externo após redução da fratura.

— QUESTÃO 06 —

Menino de 5 anos de idade, com queixa de claudicação à custa do membro inferior direito há 1 mês: Exame físico: bom estado geral, afebril dor nos movimentos de rotação interna e externa do quadril direito. Rx simples de bacia é normal. Foi solicitado cintilografia óssea, que mostrou diminuição da captação ao nível da epífise proximal do fêmur à direita. O diagnóstico mais provável será:

- (A) piodartrite do quadril.
- (B) luxação congênita do quadril.
- (C) moléstia de Perthes.
- (D) displasia epifisária.

— QUESTÃO 07 —

A escoliose idiopática do adolescente aparece por volta de 11 anos de idade e é predominantemente incidente no sexo feminino. Nela se encontra como tipo de curva principal mais freqüente a:

- (A) Torácica esquerda.
- (B) Lombar esquerda.
- (C) Lombar direita.
- (D) Torácica direita.

— QUESTÃO 08 —

Os nódulos de Heberden são mais encontrados nas seguintes articulações :

- (A) tarsometatarsicas.
- (B) metacarpofalangianas.
- (C) interfalangianas proximais.
- (D) interfalangianas distais.

— QUESTÃO 09

Paciente do sexo feminino com 18 anos de idade apresenta dor no joelho direito com claudicação à marcha. Relata que a dor piora no período pré-menstrual. O exame físico revela frouxidão ligamentar, hiperextensão do joelho, hipertrofia da gordura retropatelar com dor à palpação da mesma. Este quadro clínico é característico da seguinte síndrome:

- (A) Pellegrini.
- (B) Reiter.
- (C) Hoffa.
- (D) O'Donoghue.

— QUESTÃO 10

Um paciente de 30 anos, até então assintomático, foi tirar uma caixa de cerveja cheia do porta malas do carro quando sentiu fortes dores na coluna lombar baixa, que se irradiava para a face posterior da coxa, perna e borda lateral do pé, à esquerda, ficando com a coluna "travada" em posição antálgica. A provável hipótese diagnóstica é:

- (A) ruptura do disco intervertebral entre L5 e S1 e compressão da raiz S1.
- (B) ruptura do disco intervertebral entre L5 e S1 e compressão da raiz de L5.
- (C) ruptura do disco intervertebral entre L4 e L5 e compressão da raiz de L5.
- (D) espondilolistese aguda (escorregamento) entre L5 S1 e compressão da raiz de L5.

— QUESTÃO 11

Na coalizão tarsal, a imagem radiográfica conhecida como "nariz de tamanduá" é característica da barra:

- (A) talo calcaneana, na incidência de perfil.
- (B) talo calcaneana, na incidência oblíqua.
- (C) calcâneo navicular, na incidência de perfil.
- (D) calcâneo navicular, na incidência oblíqua.

— QUESTÃO 12

Na hérnia de disco C6 C7, o músculo comumente afetado é o:

- (A) braquioradial.
- (B) bíceps braquial.
- (C) flexor radial do carpo.
- (D) extensor radial longo do carpo.

— QUESTÃO 13

No tratamento cirúrgico da fratura transversa da patela, a técnica da banda de tensão promove mais compressão:

- (A) estática na superfície anterior.
- (B) dinâmica na superfície anterior.
- (C) estática na superfície posterior.
- (D) dinâmica na superfície posterior.

— QUESTÃO 14

A artrite séptica secundária à osteomielite hematogênica pode ocorrer nas metáfises:

- (A) proximal do fêmur, distal do úmero e distal da fíbula.
- (B) proximal do fêmur, distal do úmero e proximal do úmero.
- (C) proximal do fêmur, proximal do úmero e distal da fíbula.
- (D) proximal do úmero, distal do úmero e distal da fíbula.

— QUESTÃO 15

A doença de FREIBERG acomete mais frequentemente o núcleo de ossificação do:

- (A) terceiro osso metatarsal nas meninas.
- (B) segundo osso metatarsal das meninas.
- (C) segundo osso metatarsal nos meninos.
- (D) terceiro osso metatarsal dos meninos.

— QUESTÃO 16

Na fratura em "galho verde" do antebraço com desvio dorsal, a cortical anterior do rádio foi submetida a uma força de:

- (A) Tensão.
- (B) Compressiva.
- (C) Cisalhamento.
- (D) Rotação.

— QUESTÃO 17

Na fratura do maléolo lateral, a radiografia sob estresse para a detecção de lesão do ligamento deltoíde deve ser realizada em:

- (A) pronação e rotação lateral.
- (B) pronação e rotação medial.
- (C) supinação e rotação medial.
- (D) supinação e rotação lateral.

— QUESTÃO 18

A pseudoartrose atrófica da diáfise do rádio, com defeito de 10 mm ulna intacta, tem como melhor indicação:

- (A) transporte ósseo monofocal no rádio.
- (B) encurtamento da ulna com osteossíntese rígida de ambos os ossos.
- (C) a excisão do fragmento distal do rádio e transferência da ulna para o defeito.
- (D) a ressecção do tecido cicatricial, enxertia óssea e osteossíntese do rádio.

— QUESTÃO 19

Na lesão do anel pélvico do tipo C de Tile, com instabilidade hemodinâmica, o dispositivo ideal de fixação provisória é o:

- (A) fixador externo supra acetabular.
- (B) clampe posterior.
- (C) calção pneumático antichoque (PTSG).
- (D) enfaixamento circunferencial com lençol (fraudão).

— QUESTÃO 20

Na pronação dolorosa, o ligamento anular do rádio apresenta deslocamento:

- (A) medial.
- (B) lateral.
- (C) proximal.
- (D) distal.

— QUESTÃO 21

Na fixação externa de fratura em ossos longos, a ocorrência de retardo de consolidação é mais freqüentemente associada com :

- (A) afrouxamento dos pinos.
- (B) excesso de rigidez da montagem.
- (C) infecção.
- (D) instabilidade.

— QUESTÃO 22

A lesão traumática do menisco lateral do joelho mais frequente é a:

- (A) transversa incompleta.
- (B) transversa completa.
- (C) longitudinal incompleta.
- (D) longitudinal completa.

— QUESTÃO 23

Na Síndrome do Túnel do Carpo, o achado clínico mais frequente é a:

- (A) dor.
- (B) perda da sensibilidade.
- (C) parestesia.
- (D) atrofia muscular.

— QUESTÃO 24

Na osteoporose primária, a fosfatase alcalina e o cálcio sérico estão, respectivamente:

- (A) normal e aumentado.
- (B) normal e normal.
- (C) aumentado e normal.
- (D) aumentada e aumentada.

— QUESTÃO 25

Na luxação traumática do ombro, o principal fator que determina a recidiva é:

- (A) idade.
- (B) a duração da luxação.
- (C) a modalidade esportiva.
- (D) o tempo de imobilização.